



Crisalide-Adriano Marangoni - olio su legno

SUNTO

Il dolore non è solo un sintomo.

E' una malattia che va curata.

Il dolore è una malattia inutile che limita l'autonomia e le attività quotidiane, può essere curato come una malattia cronica ma il medico deve destreggiarsi tra il paziente ed il dovere, anche deontologico, di protezione sociale

Avv. Paola M. Ferrari
VIDEO DOSSIER

RESPONSABILITA' SANITARIA IN 5 MINUTI

FARMACI OPPIOIDI


UTILI, IMPORTANTI, NON PER TUTTI

Comunicazione Aifa 30 giugno 2020

Sommario

| | |
|--|---|
| IL VIDEO | 1 |
| FARMACI OPIOIDI- L'AIFA RICHIAMA ALL'ORDINE | 2 |
| I LIMITI | 2 |
| INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I MEDICI PRESCRITTORI | 2 |
| PER TUTTI I MEDICINALI OPIOIDI..... | 2 |
| LA FORMAZIONE DEL PAZIENTE | 3 |
| INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PAZIENTI..... | 3 |
| PROTEGGERE DALL'USO ACCIDENTALE DI OPIOIDI..... | 3 |
| ESISTONO MODELLI INFORMATIVI CHE IL MEDICO PUÒ UTILIZZARE? | 3 |

IL VIDEO



FARMACI OPIOIDI- L'AIFA RICHIAMA ALL'ORDINE

[l'Agenzia Italiana del Farmaco \(AIFA\), attraverso la comunicazione del 30 Giugno 2020, desidera richiamare l'attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e tramadolo.](#)

Indicazione che completa le linee guida del 2016 [Linee guida sulla prescrizione dei farmaci oppiacei nella terapia del dolore cronico elaborate dai Cdc](#) (Centers for Disease Control and Prevention).

E' stato spesso rilevato l'utilizzo per periodi prolungati ed è stato osservato un cospicuo numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse conseguenti all'uso per indicazioni terapeutiche non autorizzate, quali il trattamento di stati dolorosi di lievi entità come l'emicrania, la cefalea, nevralgia, dismenorrea, emorroidi, mal di denti, etc...

I LIMITI

Si comunica inoltre che, a seguito di una recente disposizione AIFA, è stata introdotta **la limitazione della durata massima di terapia a 30 giorni per le prescrizioni dei medicinali contenenti il principio attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I MEDICI PRESCRITTORI

- **Tramadolo** è indicato solo per il trattamento del dolore da moderato a grave, come pure in dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.
- **Fentanile** è indicato per la gestione del dolore cronico grave che richiede la somministrazione continua a lungo termine di oppioidi ovvero per il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da cancro (ad esclusione della soluzione iniettabile).

Entrambi questi medicinali non devono essere prescritti per il trattamento di stati dolorosi di lieve entità quali l'emicrania, la cefalea, nevralgia, dismenorrea, emorroidi, mal di denti, etc.

PER TUTTI I MEDICINALI OPIOIDI

- È particolarmente importante che i medicinali di questa classe terapeutica siano utilizzati per il minor tempo possibile per limitare il rischio di dipendenza;
- Il dosaggio deve essere ridotto gradualmente prima di interrompere il trattamento, per evitare problemi di sindrome da astinenza.

Si raccomanda ai medici prescrittori di:

- tenere in monitoraggio i pazienti ai quali tali medicinali sono prescritti;
- utilizzarli in accordo alle indicazioni autorizzate riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di ogni singolo medicinale. Gli RCP sono consultabili nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

LA FORMAZIONE DEL PAZIENTE

Accertarsi che i pazienti comprendano come e quando assumere il trattamento e pianifichino insieme a loro la durata più breve possibile dello stesso.

A tal riguardo, tutti i pazienti che ricevono la prescrizione di un medicinale oppioide devono essere istruiti sull'uso appropriato e sui rischi di abuso e dipendenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PAZIENTI

Ai medici prescrittori si raccomanda di assicurarsi che i pazienti comprendano l'importanza di quanto riportato di seguito:

- Conservare questi medicinali in un luogo sicuro, sia dentro che fuori casa per proteggerli dal furto, poiché potrebbero essere un obiettivo per le persone che abusano di medicinali;
- Non somministrare mai i medicinali oppioidi a nessun altro che non sia il destinatario della prescrizione, anche se sembra avere gli stessi sintomi;
- Riferire al proprio medico tutti i problemi di salute fisica e mentale, in particolare quelli relativi ad abusi, pregressi o in atto, di droghe o alcool, come anche di eventuali problemi personali o familiari di dipendenza;
- Non assumere questi medicinali per il trattamento di stati dolorosi diversi da quelli per i quali sono stati prescritti.

PROTEGGERE DALL'USO ACCIDENTALE DI OPIOIDI

- I pazienti, o chi se ne prende cura, devono essere informati che i medicinali oppioidi contengono un principio attivo in una quantità che può essere fatale per un bambino e causare problemi respiratori
- potenzialmente letali a chiunque li assuma accidentalmente.
- L'AIFA coglie l'occasione per ricordare a tutti i medici e ai farmacisti l'importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego.

ESISTONO MODELLI INFORMATIVI CHE IL MEDICO PUÒ UTILIZZARE?

Purtroppo, non esiste materiale informativo istituzionale sul punto.

Si indicano alcuni materiali che possono essere presi come spunto per la creazione di schede formative per il paziente.

MEDINLINPLUS - Abuso di oppiacei e trattamento della dipendenza -

- Arabo (العربية)
- Cinese, semplificato (dialetto mandarino) (简体中文)
- Cinese, tradizionale (dialetto cantonese) (繁體中文)
- Francese (français)
- Hindi (हिन्दी)
- Giapponese (日本語)

- [Coreano](#) (한국어)
- [Nepalese](#) (नेपाली)
- [Russo](#) (Русский)
- [Somalo](#) (Af-Soomaali)
- [Spagnolo](#) (español)
- [Vietnamita](#) (Tiếng Việt)

[EMENTALHEALTH.CA - Farmaci di tipo oppioide: informazioni per i pazienti e le loro famiglie](#)

[scheda informativa utile per costruire una informazione standard](#)